



10/506/66

REC'D 06 JUN 2003

WIPO PCT

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 10 MARS 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 300301

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>7 MARS 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0202879</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE <b>- 7 MARS 2002</b> PAR L'INPI		<input checked="" type="checkbox"/> <b>NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b>  <b>Cabinet REGIMBEAU</b> <b>20, rue de Chazelles</b> <b>75847 PARIS CEDEX 17</b> <b>FRANCE</b>	
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) <b>239497 NT</b>			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b>		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet <input checked="" type="checkbox"/>			
Demande de certificat d'utilité <input type="checkbox"/>			
Demande divisionnaire <input type="checkbox"/>			
Demande de brevet initiale N° _____ Date _____			
ou demande de certificat d'utilité initiale N° _____ Date _____			
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale <input type="checkbox"/>		N° _____ Date _____	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b>  <b>COMBINAISON CHIMIOThERAPIE ET ANTISENS DE LA DNA DEMETHYLASE.</b>			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> <b>S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> <b>S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>	
Nom ou dénomination sociale  Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF		<b>CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)</b>  <b>ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNO...</b> <b>304981310</b>	
Adresse Rue Code postal et ville Pays		<b>3, rue Michel Ange, 75016 PARIS</b>  <b>FRANCE</b> <b>Française</b>	
Nationalité N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif)			

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **7 MARS 2002**

LIEU **75 INPI PARIS**

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

**0202879**

08 540 W / 300301

**Vos références pour ce dossier :**  
(facultatif)

**239497 NT**

**6 MANDATAIRE**

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

**Cabinet REGIMBEAU**

N° de pouvoir permanent et/ou  
de lien contractuel

Adresse

Rue

**20, rue de Chazelles**

Code postal et ville

**75847 PARIS CEDEX 17**

N° de téléphone (facultatif)

**01 44 29 35 00**

N° de télécopie (facultatif)

**01 44 29 35 99**

Adresse électronique (facultatif)

**info@regimbeau.fr**

**7 INVENTEUR (S)**

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui

☒ Non

**Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée**

**8 RAPPORT DE RECHERCHE**

**Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)**

Établissement immédiat  
ou établissement différé

☒

☐

Paiement échelonné de la redevance

**Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques**

☐ Oui

☐ Non

**9 RÉDUCTION DU TAUX  
DES REDEVANCES**

**Uniquement pour les personnes physiques**

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):

Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,  
indiquez le nombre de pages jointes

**10 SIGNATURE DU DEMANDEUR  
OU DU MANDATAIRE**  
(Nom et qualité du signataire)



92-1102

**VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI**

  
**LEFICHET**

5 La présente invention se rapporte à un produit de combinaison comprenant un antisens du gène codant pour la déméthylase MBD2 et au moins un agent utilisé en chimiothérapie antitumorale, en particulier la bléomycine, pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps pour le traitement des maladies

10

La méthylation de l'ADN est un mécanisme épigénétique important qui régule l'expression des gènes (1-4). L'une des caractéristiques des cellules cancéreuses réside dans un schéma aberrant de méthylation (5). Deux changements contradictoires du schéma de méthylation ont été antérieurement documentés, à savoir l'hyperméthylation

15 de gènes sélectionnés (6) et l'hypométhylation globale (7).

A l'heure actuelle, on ne sait pas parfaitement quels sont les mécanismes responsables des changements observés dans la méthylation de l'ADN. Il est possible que ces changements soient une conséquence de la dérégulation de l'expression des différents

20 composants de la machinerie de méthylation de l'ADN (8). La machinerie de méthylation de l'ADN est composée d'ADN-méthyltransférase (9), de déméthylases (10), (11) et (12), et de protéines de liaison de l'ADN méthylé (MBD) qui interprètent le signal de méthylation de l'ADN (13). Un certain nombre d'observations étayaient l'hypothèse selon laquelle la dérégulation de l'ADN-méthyltransférase d'entretien

25 DNMT1 joue un rôle important dans la tumorigenèse (14), (15) et (16). Une question importante est donc de savoir si d'autres composants de la machinerie de méthylation de l'ADN présentent eux aussi un caractère critique pour la transformation cellulaire (8) et (17).

Il a été proposé que l'hyperméthylation des gènes suppresseurs de tumeur servirait de mécanisme pour rendre silencieux des gènes critiques, qui inhibent différentes étapes de la tumorigenèse. Cette hyperméthylation aurait pour conséquence de favoriser le processus conduisant à la transformation des cellules (18). Des cytosines méthylées  
 5 sont spécifiquement reconnues par les MBD (13) et (19-21), qui s'associent à des corépresseurs tels que le Sin3A, recrutent des histone-désacétylases pour des gènes méthylés (22-26) et peuvent être trouvées dans des complexes connus de répression de la transcription, tels que le Mi2 (27).

10 Le Mecp2, qui est le membre le mieux caractérisé de la famille, n'est probablement pas très important pour ce qui est de rendre les gènes silencieux pendant la transformation, car il n'est pas exprimé dans les cellules cancéreuses (20). D'autres protéines candidates doivent être mises en jeu. Une protéine de liaison de l'ADN méthylé récemment caractérisée, la MBD2, est un candidat intéressant pour les raisons  
 15 exposées ci-après.

Tout d'abord, l'ADNc de MBD2 a été cloné à partir d'une banque d'ADNc d'une lignée de cellules cancéreuses (28), et il s'est avéré qu'il est exprimé dans des échantillons et des lignées cellulaires de cancer du sein (29). Deuxièmement, la protéine est impliquée  
 20 non seulement dans la suppression du gène par un mécanisme analogue à celui qui est présenté pour le Mecp2 (24) et (27), mais il s'est aussi avéré qu'elle porte également une activité de déméthylase (28).

L'activité de déméthylase a été antérieurement purifiée à partir d'une lignée de cellules  
 25 humaines non-petites de cancer du poumon A549 (12), et il s'est de même avéré que la transfection de la lignée de cellule d'embryon P19 par le Ha-Ras proto-oncogène conduit à une augmentation de l'activité de déméthylase (30). Il n'est pas impossible qu'une activité accrue de déméthylase soit associée à une tumorigenèse, et qu'elle pourrait être en partie responsable de l'hypométhylation globale observée dans les  
 30 cellules cancéreuses (17). Ainsi, la MBD2/déméthylase pourrait faire partie de la

machinerie impliquée dans la médiation ou l'interprétation des deux changements contradictoires associés au schéma de méthylation de l'ADN dans les cellules cancéreuses, à savoir l'hyperméthylation et l'hypométhylation.

- 5 Bien que cette activité de déméthylase a été contestée par certains groupes (24), il a été montré que la Mbd2b/déméthylase obtenue par recombinaison, exprimée dans une lignée cellulaire SF-9 hétérologue, présente une activité de déméthylase. En outre, la co-transfection de la Mbd2b/déméthylase et des plasmides méthylés provoque une déméthylation de ces plasmides et l'expression forcée de la Mbd2b/déméthylase dans  
10 les cellules PANC-1 conduit à une déméthylation et à l'induction du promoteur endogène MUC-2.

La présente invention apporte les éléments démontrant que la Mbd2/déméthylase est effectivement exprimée dans les cellules cancéreuses, et qu'elle est essentielle à la  
15 croissance de cellules tumorales en culture et in vivo.

Aucune combinaison de génothérapie et de chimiothérapie, consistant à associer un agent utilisé en chimiothérapie antitumorale avec une génothérapie sur la base d'un antisens d'un gène impliqué dans le niveau de méthylation de l'ADN comme celui de  
20 la MBD2/déméthylase, n'a été décrite dans l'état de la technique.

Or, en combinant une chimiothérapie utilisant la bléomycine et l'électrotransfert intratumoral d'un plasmide codant pour l'antisens génétique de l'ADN déméthylase humaine MBD2, on obtient un effet synergique puissant dans le traitement des  
25 tumeurs. Le principal avantage de l'invention est donc sa surprenante efficacité, puisque, si l'on considère le taux de guérison complète des tumeurs, il est de 10% en utilisant la génothérapie par électrotransfert du gène MBD2 déméthylase seul, et aussi de 10 % avec la chimiothérapie bléomycine seule, et ce taux monte à 40 % en utilisant la combinaison des deux traitements : géno- et chimiothérapie.

### Description

Ainsi, la présente invention se rapporte à un produit de combinaison comprenant au moins un oligonucléotide antisens du gène codant pour la déméthylase MBD2 et au moins un agent utilisé en chimiothérapie antitumorale pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps destiné au traitement des maladies prolifératives et inflammatoires.

10 Dans un mode de réalisation particulier, l'antisens du gène codant pour la déméthylase MBD2 comprend au moins 15 nucléotides consécutifs de la séquence SEQ ID N°1 ou de sa séquence complémentaires ou de la SEO ID N°2.

La SEQ ID NO 1 correspond à la séquence décrite dans GENE BANK sous le numéro  
15 d'accèsion AF 072242 (Homo sapiens methyl-CpG binding protein MBD2 (MBD2)  
mRNA, complete cds).

SEO ID No 1 :

[illegible]

gggtaaaccagacttgaatacaacattgccattagacaaacagcatcaatttcaaacaaccggtaaccaaagtcacaaatc  
 atcctagtaataaagtgaatcagaccacaaacgaatgaatgaacagccacgtcagcttttctgggagaagaggctacaag  
 gactagtgcacatcagatgtaacagaacaaattataaaaacatggaactacccaaaggcttcaaggagttggtccaggtagc  
 aatgatgagacccttttatctgctgttgccagtgcttgcacacaagcctgcgccaatcacagggaagctctccgctgctgt  
 5 ggaaaagaaccctgctgtttggcttaacacatctcaaccctctgcaaagctttattgtcacagatgaagacatcaggaaaca  
 ggaagagcgagtacagcaagtagcaagaaattggaagaagcactgatggcagacatctgtcgcgagctgctgatacag  
 aagagatggatattgaaatggacagtggagatgaagcctaagaatatgatcaggtaactttcgaccgactttcccaagrgaa  
 aattcctagaaattgaacaaaaatgttccactggctttgcctgtaagaaaaaaatgtacccgagcacatagagcttttaata  
 gcactaaccaatgccttttagatgtattttgatgtatatatctatttcaaaaaatcatgttttttgatcctaggacttaaaatt  
 10 agtcttttgaatatcaagcaggaccctaagatgaagctgagctttgatgccaggtgcaatctactggaaatgtagcacttacg  
 taaaacattgtttccccacagtttaataagaacagatcaggaattctaaataaatttccaggttaagattattgtgacttact  
 gtatataacatatattttatactttattgaaaggggacacctgtacattctccatcatcactgtaagacaaataaatgattatattc  
 acaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- 15 Parmi les séquences antisens préférées de l'invention on note plus particulièrement la  
 séquence SEQ ID No 2, qui correspond à l'ARN messager entier de la déméthylase  
 dans l'orientation antisens :

cgcattgcataagcttgcctgagcttagattttttttttgtctgtgaatataatcatttattgtctttacagtgatgatgaa  
 gaattgtacaggtgtccctttcaataaagtataaaaatattttatatacagtgaagtcacaataatctttaactgggaaattattt  
 20 agaattcctgatctgttcttattaaaactgtgggggaaacaaatgtttacgtaagtgctacattccagtagattgcacctggcat  
 caaaagctcagcttcatcttagggctcctgctgtatattacaaaagactaattttaagtcctaggactcaaaataaacatgattttt  
 gaataatagatatatacatcaaaaatacatctaaaaagccattgggttagtgctattaaaaagctctatgtgctcgggtacattttt  
 tcttacaggcaaaagccagtggaacattttgttcaattctaggaatttctcgttgggaaagtcggtcgaaagttacctgatc  
 atattcttaggcttcatctccactgtccattcaatatccatctctctgtatcagcagctcgcgacaagatgtctgcatcagtgct  
 25 tcttccaatttcttgcgtacttgctgtactcgtcttctgtttcctgatgtcttcatctgtgacaataaaagctttgcagaggggtg  
 agatgtgttaagccaaacagcaggggttctttccacagcagcggagacttgcctgtgattggcgagagcttgtgtgcaaag  
 cactggcaacagcagataaaagggtctcatcttgcctggaccaactccttgaagaccttgggtagttccatggttttat  
 aattgttctgttacatctgatgcactaagtcctttagcctcttctccagaaaagctgacgtggctgttcaattcattcggttggg  
 tctgatttcatttattactaggatgatttgtgacttgggtaccgggtgttgaattgatgctgtttgtctaattggcaatgtgtatt  
 30 caagtctggtttacccttattttagtgagaggatcgtttcgagctctgtttgttcttctgtaatttactaggcatcatcttccaggt



ctgaagtcaaaactgctgagatcaacagtatttcccaggtaccttgccaactgaggcttgcttctgaacttcttaccacttggact  
 gaagtagtagacatcgctcttgccagcacttagcccagatttctggaicacttctctcttctccatccgggggggagggccg  
 ggcaatccatctcttcccgtctccgtggcccgggggtcccctgggccccggccccgcgctccccgacgggaaagggac  
 cggctccgtcgacggcc

- 5 Cette séquence antisens a été utilisée dans le cadre des expériences présentées dans l'exemple 1.

Ainsi, l'invention vise un produit de combinaison tel que mentionné précédemment dans lequel l'antisens comprend au moins :

- 10 a) 15 nucléotides consécutifs de la séquence SEQ ID N°1 ou de sa séquence complémentaire ou de la séquence SEQ ID No 2, ou  
 b) une séquence capable de s'hybrider de manière sélective à l'une des séquences définies en a).

- 15 Par « séquence capable de s'hybrider de manière sélective », on entend les séquences qui s'hybrident avec les séquences évoquées ci-dessus à un niveau supérieur au bruit de fond de manière significative. Le bruit de fond peut être lié à l'hybridation d'autres séquences d'ADN présentes, notamment d'autres ARNm présents dans les cellules tumorales ciblées. Le niveau du signal généré par l'interaction entre la séquence  
 20 capable de s'hybrider de manière sélective et les séquences définies par les SEQ ID NO 1 à 2 ci-dessus est généralement 10 fois, de préférence 100 fois plus intense que celui de l'interaction des autres séquences d'ADN générant le bruit de fond. Le niveau d'interaction peut être mesuré par exemple, par marquage de la séquence utilisée comme sonde avec des éléments radioactifs, comme le <sup>32</sup>P. L'hybridation sélective est  
 25 généralement obtenue en employant des conditions de milieu très sévères (par exemple NaCl 0,03 M et citrate de sodium 0,03 M à environ 50°C-60°C). L'hybridation peut être effectuée selon les méthodes usuelles de l'état de la technique (notamment Sambrook & al., 1989, Molecular Cloning : A Laboratory Manual).

Par un « agent utilisé en chimiothérapie antitumorale », on entend désigner des agents antinéoplastiques. Parmi ces agents, on peut citer :

- 5       - les composés appartenant à la famille des bléomycines (Mueller et al., Cancer, Vol. 40, p. 2787 (1977), Umezawa et al., Journal of Antibiotics, 19A, p. 210 (1966), US 4,472,304, FR2530639, et US 3,922,262), en particulier la bléomycine,
- 10       - les cytolytiques divers tels que la dacarbazine, l'hydroxycarbamide, l'asparaginase, la mitoguazone et la plicamycine,
- 15       - les agents méthylants, tels que la streptozotocine (2-deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose), la procarbazine (N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]benzamide), la dacarbazine ou DTIC (5-(3,3-dimethyl-1-triazenyl)-1H-imidazole-4-carboxamide), et la Temozolomide (8-carbamoyl-3-methylimidazo[5.1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4-(3H)-one).
- 20       - les agents chloroethylants, tels que HECNU (1-(2-chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)-1-nitrosourea), BCNU (1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea ou carmustine, Bristol-Myers), ACNU (1-(2-chloroethyl)-3-(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl-1-nitrosourea), CCNU (1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea ou lomustine), MeCCNU ((2-chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea ou semustine), la fotemustine (1-[N-(2-chloroethyl)-N-nitrosoureido]ethylphosphonic acid diethyl ester) et la  
25       clomesone (2-chloroethylmethylsulfonylmethanesulfonate) (Pegg et al., Prog. Nucleic Acid Research Molec. Biol. 51: 167-223 (1995)). Ces agents sont davantage décrits dans Colvin and Chabner. Alkylating Agents. In: Cancer.
- 30       - d'autres composés alkylants tels que les agents du type Ecteinascidin 743, les duocarmycines (Boger et al. J. Org. Chem. 1990, 55, 4499; Boger et al. J. Am.

Chem. Soc. 1990, 112, 8961; Boger et al. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 6645; Boger et al. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 9872; Boger et al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1992, 2, 759).

- 5       - les agents pro-apoptotiques sélectionnés parmi les dérivés des glucocorticoïdes, les inhibiteurs des topoisomérases tels que les inhibiteurs de la topoisomérase 2, par exemple les anthracyclines, l'épipodophyllotoxine tel que l'étoposide, les inhibiteurs de la topoisomérase 1, par exemple les dérivés de la camptothécine,
- 10       - les antimétabolites tels que les antifolates, par exemple le méthotrexate, les antipurines, par exemple la 6-mercaptopurine, les antipyrimidiques, par exemple la 5-fluorouracile,
- 15       - parmi les antimitotiques tels que les vinca-alcaloïdes, les taxoïdes tel que le taxotere,

Ces agents antinéoplastiques sont décrits dans Actualité Pharmaceutiques n°302 (Oct 1992) pages 38 à 39 et 41 à 43 incorporées dans la description par référence.

- 20       Dans un aspect préféré, l'invention vise un produit de combinaison tel que défini ci-dessus, dans lequel l'agent est sélectionné parmi les composés appartenant à la famille des bléomycines, en particulier la bléomycine.

- 25       Dans un autre mode particulier de réalisation, l'invention porte sur un produit de combinaison mentionné ci-dessus, dans lequel l'oligonucléotide antisens du gène codant pour la déméthylase MBD2 est porté par un vecteur comportant un promoteur permettant son expression efficace dans une cellule eucaryote. Ce vecteur peut également comporter une séquence poly A de terminaison de transcription.

- Chem. Soc. 1990, 112, 8961; Boger et al. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 6645; Boger et al. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 9872; Boger et al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1992, 2, 759).
- les agents pro-apoptotiques sélectionnés parmi les dérivés des glucocorticoïdes, les inhibiteurs des topoisomérases tels que les inhibiteurs de la topoisomérase 2, par exemple les anthracyclines, l'épipodophyllotoxine tel que l'étoposide, les inhibiteurs de la topoisomérase 1, par exemple les dérivés de la camptothécine,
- les antimétabolites tels que les antifolates, par exemple le méthotrexate, les antipurines, par exemple la 6-mercaptopurine, les antipyrimidiques, par exemple la 5-fluorouracile,
- parmi les antimitotiques tels que les vinca-alcaloïdes, les taxoïdes tel que le taxotère,

Ces agents antinéoplastiques sont décrits dans Actualité Pharmaceutiques n°302 (Oct 1992) pages 38 à 39 et 41 à 43.

Dans un aspect préféré, l'invention vise un produit de combinaison tel que défini ci-dessus, dans lequel l'agent est sélectionné parmi les composés appartenant à la famille des bléomycines, en particulier la bléomycine.

Dans un autre mode particulier de réalisation, l'invention porte sur un produit de combinaison mentionné ci-dessus, dans lequel l'oligonucléotide antisens du gène codant pour la déméthylase MBD2 est porté par un vecteur comportant un promoteur permettant son expression efficace dans une cellule eucaryote. Ce vecteur peut également comporter une séquence poly A de terminaison de transcription.

De préférence, le vecteur consiste en un plasmide. En effet, l'utilisation d'un plasmide est plus économique et plus sûr que l'utilisation des virus. De plus, ce mode de réalisation de l'invention permet la réadministration sans déclencher de réponse immunitaire. Ce plasmide comprend avantageusement un promoteur, la séquence antisens selon l'invention et une séquence terminateur de la transcription. De préférence, la séquence de l'antisens est insérée dans le plasmide pcDNA3.1HisA de la compagnie InVitrogen.

Le produit selon l'invention peut comporter en outre un ou plusieurs véhicule(s) pharmaceutiquement acceptable(s). Il est destiné en particulier pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps destiné au traitement du cancer. En ce sens, dans un mode préféré, les formulations sont adaptées à une administration par injection intratumorale.

Les techniques permettant le transfert du plasmide dans les cellules cibles sont bien connues de l'homme du métier. En particulier, on se référera aux techniques d'électrotransfert dans les cellules eucaryotes décrites dans WO 99/01157 et Bettan et al, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 2000, 52 :83-90. Dans WO 99/01157, une méthode pour transfert in vivo des acides nucléiques est proposée en utilisant des champs électriques faibles compris entre 1 et 600 V/cm. D'autres approches sont décrites dans Wolf et al. Science 247, 1465-68, 1990 ; Davis et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 7213-18, 1996) dans lesquelles l'ADN est associé à des composés destinés à favoriser sa transfection, comme des protéines, des liposomes, des lipides chargés ou des polymères cationiques tels que le polyéthylèneimine, qui sont de bons agents de transfection in vitro (Behr et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 6982-6, 1989 ; Felgner et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84, 7413-7, 1987 ; Boussif et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92, 7297-301, 1995).

Ainsi, conformément à l'invention, l'antiken peut également être transféré sous la forme d'ADN double brin ou d'un autre vecteur génomique approprié.

ou non avec une molécule favorisant le transfert et/ou en utilisant un faible champs électrique.

5 L'invention s'étend également à toute application permettant de traiter le cancer comprenant l'utilisation d'un produit de combinaison mentionné ci-dessus et une troisième substance active utilisée dans le cadre du traitement du cancer. A ce titre, l'invention couvre la tri-thérapie comportant l'administration du produit de combinaison selon l'invention et une troisième substance active.

10 La Mbd2/déméthylase est exprimée dans des tumeurs in vivo et est surexprimée dans un pourcentage significatif de tumeur d'une manière analogue à Dmmt1. Alors que notre analyse d'un nombre limité de tumeurs ne prouve pas que la Mbd2/déméthylase est généralement dérégulée les cellules cancéreuses, nos données sont compatibles avec ce modèle. Deuxièmement, nous montrons que l'inhibition médiée antisens de la  
15 Mbd2/déméthylase conduit à des changements de la méthylation génomique et à une inhibition de la tumorigenèse in vitro. Différentes méthodes d'expression d'antisens ont été utilisées pour exclure la possibilité que les changements observés reflètent une certaine propriété idiosyncrasique du vecteur. Une expression transitoire de l'antisens est suffisante pour inhiber la croissance inhibée par un ancrage et un contact, ce qui  
20 indique que la Mbd2/déméthylase est nécessaire pour le maintien de l'état transformé, et que son inhibition a des effets immédiats sur la croissance des cellules cancéreuses.

De même, l'introduction d'un vecteur exprimant l'antisens de la Mbd2/ déméthylase dans des tumeurs humaines que l'on a fait passer sous forme de xénogreffes chez des  
25 souris nues a provoqué une réduction de la croissance de la tumeur, ce qui montre que la Mbd2/ déméthylase est nécessaire pour le maintien de l'état transformé. Alors que l'expression de l'antisens de la Mbd2/déméthylase inhibe considérablement la tumorigenèse in vitro, elle a un effet limité sur les tumeurs in vivo. Cela pourrait refléter la difficulté qu'il y a à délivrer et exprimer d'une manière efficace les vecteurs

antisens dans toutes les cellules d'une tumeur in vivo, plutôt qu'une indication de l'impact limité de l'inhibition de la cible.

Comme la Mbd2/ déméthylase peut soit réprimer, soit déméthyliser les gènes méthylés, il est possible qu'un certain nombre de gènes soit affecté par l'un ou l'autre de ces processus. L'inhibition de la répression, médiée par la Mbd2/déméthylase, de l'activité de gènes méthylés pourrait se traduire par une activation d'un certain nombre de suppresseurs tumoraux. Par ailleurs, l'activité de déméthylase pourrait être requise pour inhiber une méthylation aberrante des gènes qui sont critiques pour le phénotype transformé. Une inhibition de la déméthylase pourrait conduire à une méthylation ectopique, des gènes critiques étant rendus silencieux d'une manière stochastique.

Comme les deux activités de Mbd2/déméthylase doivent affecter une large gamme de gènes, un résultat possible pourrait avoir été un effondrement du programme d'expression des gènes. Une telle possibilité devrait avoir limité le potentiel thérapeutique de l'inhibition de la Mbd2/déméthylase. Cependant, l'analyse du schéma génique des cellules dans lesquelles la Mbd2/déméthylase est inhibée n'étaye pas cette hypothèse.

Ainsi, l'inhibition de la Mbd2/ déméthylase se traduit par une répression et par une induction de l'expression des gènes impliqués dans le processus tumoraux, mais ne présente pas d'inconvénient pour une application thérapeutique. Des changements de l'expression des gènes après traitement par l'antisens de Mbd2/déméthylase apparaissent limités, or ces changements, renforcés par un agent alkylant, sont responsables de la forte inhibition de la tumorigénèse in vitro.

Ainsi, l'invention propose d'utiliser conjointement la Mbd2/déméthylase comme cible anti-cancéreuse et un agent alkylant de l'ADN. Le fait que le cycle cellulaire des cellules normales ne soit pas affecté par ce traitement, et le fait que ce traitement ne provoque pas d'effets secondaires graves, sont des avantages importants de l'invention.

de cette cible. L'inhibition de la Mbd2/déméthylase pourrait avoir un effet thérapeutique à deux niveaux, l'un dans le rétablissement de l'état normal de méthylation génomique par inhibition d'une déméthylase à surrégulation aberrante, et un autre, qui empêche que deviennent silencieux des gènes suppresseurs de tumeur mal méthylés, qui sont essentiels au maintien d'une régulation appropriée de la croissance cellulaire.

### Exemple 1 : Combinaison de thérapie génique (électrotransfert intratumoral de plasmides codant pour l'antisens de la DNA Déméthylase) et de chimiothérapie (injection intramusculaire de bléomycine)

Deux séries d'expérience ont été réalisées chez la souris nude de 18 à 20g. Les souris ont été implantées mono-latéralement avec des greffons de tumeurs H1299 (tumeurs pulmonaires humaines non à petites cellules) d'environ 20mm<sup>3</sup>. Les tumeurs se sont développées pour atteindre un volume de 20 à 150mm<sup>3</sup>. Les souris ont été triées en fonction de la taille des tumeurs et réparties en lots homogènes atteignant des volumes tumoraux de 50 à 80mm<sup>3</sup> (n=10 à 13). Les souris ont été anesthésiées avec un mélange Kétamine, Xylazine.

#### 1.1 Expérience 1 : Effet sur la croissance tumorale

Les résultats sont illustrés à la figure 1 et l'analyse statistique est présentée à la table 1 ci-dessous.

TABLE 1

ANALYSE STATISTIQUE  
Expérience 1

	Jour 1000mm <sup>3</sup> (médiane) #	
Group 1: tumeurs non traitées	14,50	
Group 3: bléomycine 25 µg	44,40	
Group 4: Antisens de la DNA Déméthylase	29,10	
Group 6: Antisens de la DNA déméthylase + bléomycine 25 µg	52,01	

Comparaison statistique	test t de Student		Log-Rank Kaplan Meier	
	Comparaison de moyenne	Risque d'atteindre 1000mm <sup>3</sup> de volume tumoral		
Antisens de la DNA Déméthylase versus non traité	p < 0,0001	***	p < 0,0001	***
25µg bléomycine versus non traité	p < 0,0001	***	p < 0,0001	***
Antisens de la DNA Déméthylase + 25 µg bléomycine versus 25µg bléomycine	p = 0,1079	NS	p = 0,1946	NS
Antisens de la DNA Déméthylase + 25 µg bléomycine versus non traité	p < 0,0001	***	p < 0,0001	***

#: nombre de jours pour atteindre 1000 mm<sup>3</sup> volume tumoral



1.1.1 Tumeurs contrôles : une série de tumeurs n'a subi aucun traitement.

- 5 1.1.2 Tumeurs traitées avec le gène codant pour l'antisens de la DNA Déméthylase seul :

Cinq électrotransferts de 50µg de plasmide dans 80µL NaCl 150mM ont été réalisés dans les tumeurs aux jours indiqués par les flèches. La solution de plasmide a été injectée longitudinalement en périphérie de la tumeur à l'aide d'une seringue Hamilton. Les faces latérales des tumeurs ont été enduites de gel conducteur et les tumeurs ont été placées entre 2 électrodes plates en acier inoxydable distantes de 0.4 à 0.7 cm. Vingt à 30 sec après l'injection, les plasmides ont été électrotransférés en utilisant un générateur d'impulsions électriques (carrées) du commerce (Electropulsateur PS 15 Jouan) . Chaque tumeur a été soumise à 500V/cm délivrés en 8 pulses d'une durée de 20msec à une fréquence de 1 Hertz .

1.1.3 Tumeurs traitées à la bléomycine seule :

- 20 Vingt-cinq µg de bléomycine/animal dans 50µL de NaCl 150mM ont été injectés en bilatéral dans le muscle tibialis cranialis et 30 minutes après, chaque tumeur a été soumise à 1 électrotransfert comme explicité ci-dessus.

- 25 1.1.4 Tumeurs traitées avec une combinaison des 2 traitements (antisens et bléomycine) :

Vingt-cinq µg de bléomycine/animal dans 50µL de NaCl 150mM ont été injectés en bilatéral dans le muscle tibialis cranialis et 30 minutes après 50µg de plasmide antisens dans 80µL NaCl 150mM ont été injectés et électrotransférés. Quatre autres

électrotransferts de 50µg de plasmide antisens dans 80µL NaCl 150mM ont ensuite été réalisés dans les tumeurs aux jours indiqués par les flèches.

Les volumes tumoraux ont été mesurés individuellement pour chaque tumeur à l'aide d'un pied à coulisse électronique à affichage digital suivant la formule (longueur X largeur X épaisseur)/2.

La médiane des volumes tumoraux a été reportée en graphique, en fonction du temps.

## 1.2 Expérience 2 : Effet sur la croissance tumorale

10

Les résultats sont illustrés à la figure 2 et l'analyse statistique est présentée à la table 2 ci-dessous.

TABLE 2

ANALYSE STATISTIQUE  
Expérience 2

Group 1: NaCl / ET	J 1000mm3 (médiane) #	20,90
Group 2: 25 µg bléomycine		38,00
Group 3: Antisens de la DNA Déméthylase		38,60
Group 4: Antisens de la DNA Déméthylase + 25 µg bléomycine		52,00

Comparaison statistique	test t de Student	Log-Rank Kaplan Meier	Risque d'atteindre 1000mm3 de volume tumoral	
	Comparaison de moyenne			
Antisens de la DNA Déméthylase versus NaCl /ET	p = 0,0201	*	p = 0,0029	**
25µg bléomycine versus NaCl /ET	p = 0,0008	***	p = 0,0001	***
Antisens de la DNA Déméthylase + 25 µg bléomycine versus 25µg bléomycine	p = 0,0088	**	p = 0,0056	**
Antisens de la DNA Déméthylase + 25 µg bléomycine / NaCl /ET	p = 0,0001	***	p<0,0001	***

#: nombre de jours pour atteindre 1000 mm3 volume tumoral

15 1.2.1 Tumeurs contrôles : Cinq électrotransferts de 80µL NaCl 150mM ont été réalisés dans les tumeurs aux jours indiqués par les flèches.

1.2.2 Tumeurs traitées avec le gène codant pour l'antisens de la DNA Déméthylase seul : Cinquante µL de NaCl 150mM ont été injectés en bilatéral dans le muscle tibialis cranialis et 30 minutes après, un électrotransfert de 50µg de plasmide antisens

20

dans 80µL NaCl 150mM a été réalisé. Quatre autres électrotransfert de 50µg de plasmide antisens dans 80µL NaCl 150mM ont ensuite été réalisés dans les tumeurs aux jours indiqués par les flèches.

- 5 1.2.3 Tumeurs traitées à la bléomycine seule : Vingt cinq µg de bléomycine/animal dans 50µL de NaCl 150mM ont été injectés en bilatéral dans le muscle tibialis cranialis et 30 minutes après, chaque tumeur a été injectée avec 80µL de NaCl 150mM et soumise à un électrotransfert. Quatre autres électrotransferts de 80µL NaCl 150mM ont ensuite été réalisés dans les tumeurs aux jours indiqués par les flèches.

10

1.2.4 Tumeurs traitées avec une combinaison des 2 traitements (antisens et bléomycine) : Vingt cinq µg de bléomycine/animal dans 50µL de NaCl 150mM ont été injectés en bilatéral dans le muscle tibialis cranialis et 30 minutes après, un électrotransfert de 50µg de plasmide antisens dans 80µL NaCl 150mM a été réalisé.

- 15 Quatre autres électrotransfert de 50µg de plasmide antisens dans 80µL NaCl 150mM ont ensuite été réalisés dans les tumeurs aux jours indiqués par les flèches.

Les volumes tumoraux ont été mesurés individuellement pour chaque tumeur à l'aide d'un pied à coulisse électronique à affichage digital suivant la formule (longueur X largeur X épaisseur)/2.

20

La médiane des volumes tumoraux a été reportée en graphique, en fonction du temps.

### 1.3 Résultats et conclusion

- 25 La combinaison de thérapie génique avec le gène codant pour l'antisens de la DNA Déméthylase humaine et de chimiothérapie à la bléomycine permet d'induire un délai cumulé de 31 à 38 jours dans la croissance des tumeurs H1299.

Un tel délai de croissance tumoral n'a jamais été atteint par les traitements administrés isolément tels que la thérapie génique seule (15 à 18 jours) ou la chimiothérapie seule.

30

(17 à 20 jours et 18 à 20 jours).

TABLE 3

## Combinaison de la thérapie génique et de la chimiothérapie

Effect de multiple electrotransferts intratumoraux de plasmides codant pour l'antisens de la DNA Déméthylase humaine associés avec un traitement à la bléomycine, sur la croissance des tumeurs H1299

## a) Délais de croissance tumorale

	Expérience 1		Expérience 2	
	J1000 *	délais de croissance Traitement versus non traité	J1000 *	délais de croissance Traitement versus electro/NaCl
non traitées	J14		J21	
ET/NaCl				
Antisens de la Demethylase	J29	15 jours	J39	18 jours
Bléomycine 25µg	J44	30 jours	J38	17 jours
Antisens de la Déméthylase/bléomycine 25µg	J52	38 jours	J52	31 jours

J1000\* = nombre de jours nécessaires pour atteindre un volume tumoral de 1000mm<sup>3</sup>

La combinaison de la thérapie génique et de la chimiothérapie induit un effet synergique sur la guérison des tumeurs puisque 30 à 40% des guérisons de tumeurs ont été obtenues avec le traitement combiné, comparativement à 10% seulement avec les

5 traitements administrés isolément. (Table 4 ci-dessous).

TABLE 4

## Combinaison de thérapie génique et de chimiothérapie

## b) Guérison de tumeurs

	Expérience 1	Expérience 2
	nombre de tumeurs guéries	nombre de tumeurs guéries
non traitées	0 / 11	
NaCl/électro		0 / 11
Antisens de la Déméthylase	0 / 13	1 / 10 J53
Bléomycine 25 µg	1 / 13 J54	1 / 11 J53
Antisens de la Déméthylase/bléomycine 25µg	3 / 11 J33/J69/J69	4 / 10 J32/J35/J53/J53

Rem: les tumeurs guéries sont des tumeurs qui ne sont plus mesurables  
Jx: absence de tumeurs jusqu'au jour indiqué au delà duquel la souris est décédée

## REFERENCES

- 5        1.     Razin, A. & Szyf, M. (1984) *Biochim Biophys Acta* 782, 331-42.
2.     Razin, A. & Cedar, H. (1977) *Proc Natl Acad Sci U S A* 74, 2725-8.
3.     Razin, A. & Riggs, A. D. (1980) *Science* 210, 604-10.
- 10       4.     Razin, A. (1998) *Embo J* 17, 4905-8.
5.     Baylin, S. B., Herman, J. G., Graff, J. R., Vertino, P. M. & Issa, J. P. (1998)  
         *Adv Cancer Res* 72, 141-96.
- 15       6.     Baylin, S. B. (1992) *AIDS Res Hum Retroviruses* 8, 811-20.
7.     Feinberg, A. P. & Vogelstein, B. (1983) *Nature* 301, 89-92.
- 20       8.     Szyf, M. (1994) *Trends Pharmacol Sci* 15, 233-8.
9.     Robertson, K. D., Uzvolgyi, E., Liang, G., Talmadge, C., Sumegi, J.,  
         Gonzales, F. A. & Jones, P. A. (1999) *Nucleic Acids Res* 27, 2291-8.
- 25       10.    Weiss, A. & Cedar, H. (1997) *Genes Cells* 2, 481-6.
11.    Jost, J. P., Siegmund, M., Sun, L. & Leung, R. (1995) *J Biol Chem* 270,  
         9754-9.

12. Ramchandani, S., Bhattacharya, S. K., Cervoni, N. & Szyf, M. (1999) *Proc Natl Acad Sci U S A* 96, 6107-12.
13. Hendrich, B. & Bird, A. (1998) *Mol Cell Biol* 18, 6538-47.
- 5 14. MacLeod, A. R. & Szyf, M. (1995) *J Biol Chem* 270, 8037-43.
15. Laird, P. W., Jackson-Grusby, L., Fazeli, A., Dickinson, S. L., Jung, W. E., Li, E., Weinberg, R. A. & Jaenisch, R. (1995) *Cell* 81, 197-205.
- 10 16. Ramchandani, S., MacLeod, A. R., Pinard, M., von Hofe, E. & Szyf, M. (1997) *Proc Natl Acad Sci U S A* 94, 684-9.
17. Szyf, M. (1998) *Cancer Metastasis Rev* 17, 219-31.
- 15 18. Baylin, S. B. & Herman, J. G. (2000) *Trends Genet* 16, 168-74.
19. Meehan, R. R., Lewis, J. D. & Bird, A. P. (1992) *Nucleic Acids Res* 20, 5085-92.
- 20 20. Lewis, J. D., Meehan, R. R., Henzel, W. J., Maurer-Fogy, I., Jeppesen, P., Klein, F. & Bird, A. (1992) *Cell* 69, 905-14.
21. Cross, S. H., Meehan, R. R., Nan, X. & Bird, A. (1997) *Nat Genet* 16, 256-9.
- 25 22. Nan, X., Ng, H. H., Johnson, C. A., Laherty, C. D., Turner, B. M., Eisenman, R. N. & Bird, A. (1998) *Nature* 393, 386-9.

23. Jones, P. L., Veenstra, G. J., Wade, P. A., Vermaak, D., Kass, S. U., Landsberger, N., Strouboulis, J. & Wolffe, A. P. (1998) *Nat Genet* 19, 187-91.
- 5 24. Ng, H. H., Zhang, Y., Hendrich, B., Johnson, C. A., Turner, B. M., Erdjument-Bromage, H., Tempst, P., Reinberg, D. & Bird, A. (1999) *Nat Genet* 23, 58-61.
25. Ng, H. H., Jeppesen, P. & Bird, A. (2000) *Mol Cell Biol* 20, 1394-406.
- 10 26. Boeke, J., Ammerpohl, O., Kegel, S., Moehren, U. & Renkawitz, R. (2000) *J Biol Chem*.
27. Wade, P. A., Geronze, A., Jones, P. L., Ballestar, E., Aubry, F. & Wolffe, A. P. (1999) *Nat Genet* 23, 62-6.
- 15 28. Bhattacharya, S. K., Ramchandani, S., Cervoni, N. & Szyf, M. (1999) *Nature* 397, 579-83.
29. Vilain, A., Vogt, N., Dutrillaux, B. & Malfoy, B. (1999) *FEBS Lett* 460, 231-4.
- 20 30. Szyf, M., Theberge, J. & Bozovic, V. (1995) *J Biol Chem* 270, 12690-6.

### REVENDICATIONS

- 5 1. Produit de combinaison comprenant au moins un oligonucléotide antisens du gène codant pour la déméthylase MBD2 et au moins un agent utilisé en chimiothérapie antitumorale pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps destiné au traitement des maladies prolifératives et inflammatoires.
- 10 2. Produit de combinaison selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'antisens du gène codant pour la déméthylase MBD2 comprend au moins :
- a) 15 nucléotides consécutifs de la séquence SEQ ID N°1 ou de sa séquence complémentaire ou de la séquence SEQ ID No 2, ou
  - b) une séquence capable de s'hybrider de manière sélective à l'une des
- 15 séquences définies en a).
3. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que l'agent utilisé en chimiothérapie antitumorale est sélectionné parmi les composés appartenant à la famille des bléomycines, en particulier la bléomycine.
- 20 4. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que l'agent utilisé en chimiothérapie antitumorale est sélectionné parmi les agents antinéoplastiques capables de méthyler l'ADN, notamment parmi les agents méthylants, tels que la streptozotocine, la procarbazine, la dacarbazine et la
- 25 Temozolomide.
5. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que l'agent utilisé en chimiothérapie antitumorale est sélectionné parmi les agents chloroéthylants, les agents chloroethylants, notamment :
- 30 1-(2-chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)-1-nitrosourea,



1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea,  
 1-(2-chloroethyl)-3-(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl-1-nitrosourea,  
 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea,  
 1-(2-chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea,  
 5 1-[N-(2-chloroethyl)-N-nitrosoureido]ethylphosphonic acid diethyl ester,  
 2-chloroethylmethylsulfonylmethanesulfonate.

6. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que l'agent utilisé en chimiothérapie antitumorale est sélectionné parmi :

- 10 - les cytolytiques divers tels que la dacarbazine, l'hydroxycarbamide, l'asparaginase, la mitoguazone et la plicamycine,
- les agents pro-apoptotiques sélectionnés parmi les dérivés des glucocorticoïdes, les inhibiteurs des topoisomérases tels que les inhibiteurs de la topoisomérase
- 15 2, par exemple les anthracyclines, l'epipodophyllotoxine tel que l'étoposide, les inhibiteurs de la topoisomérase 1, par exemple les dérivés de la camptothecine,
- les antimétabolites tels que les antifolates, par exemple le méthotrexate, les antipurines, par exemple la 6-mercaptopurine, les antipyrimidiques, par
- 20 exemple la 5-fluorouracile,
- parmi les antimitotiques tels que les vinca-alcaloïdes, les taxoïdes tel que le taxotere,

25 7. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'oligonucléotide antisens du gène codant pour la déméthylase MBD2 est porté par vecteur comportant un promoteur permettant son expression efficace dans une cellule eucaryote.

8. Produit de combinaison selon l'une des revendications 7, caractérisé en ce qu'il comporte une séquence poly A de terminaison de transcription.
9. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le  
5 vecteur consiste en un plasmide.
10. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'oligonucléotide antisens est un ADN double brin.
- 10 11. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un ou plusieurs éléments favorisant le transfert de l'oligonucléotide antisens dans les cellules cibles.
- 15 12. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que l'oligonucléotide antisens est administré in vivo par électrotransfert, de préférence en utilisant des champs électriques faibles compris entre 1 et 600 V/cm.
13. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un ou plusieurs véhicule(s) pharmaceutiquement acceptable(s).
- 20 14. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 13, particulier pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps destiné au traitement du cancer.
- 25 15. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'il est adapté à une administration par injection intratumorale.

8. Produit de combinaison selon l'une des revendications 7, caractérisé en ce qu'il comporte une séquence poly A de terminaison de transcription.
9. Produit de combinaison selon la revendication 7, caractérisé en ce que le vecteur  
5 consiste en un plasmide.
10. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'oligonucléotide antisens est un ADN double brin.
- 10 11. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un ou plusieurs éléments favorisant le transfert de l'oligonucléotide antisens dans les cellules cibles.
- 15 12. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que l'oligonucléotide antisens est adapté à une administration in vivo par électrotransfert, de préférence en utilisant des champs électriques faibles compris entre 1 et 600 V/cm.
- 20 13. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un ou plusieurs véhicule(s) pharmaceutiquement acceptable(s).
14. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 13, particulier pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps destiné au traitement du cancer.
- 25 15. Produit de combinaison selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'il est adapté à une administration par injection intratumorale.




FIGURE 1




FIGURE 2

## LISTE DE SEQUENCES

<110> Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS

<120> Combinaison chimiothérapie et antisens de la DNA  
déméthylase

<130> D19864

<160> 2

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 1966

<212> ADN

<213> Homo sapiens

<400> 1

```

gggggcggtg ccccgagaag gcggagacaa gatggccgcc catagcgctt ggaggaccta 60
agagcggtg gccggggcca cggccggggc aggagggccg ctctgtgcgc gcccgctcta 120
tgatgcttgc gcgcgtcccc cgcgcgcgcg gctgcgggcg gggcggttct ccgggattcc 180
aagggtcgcg ttacggaaga agcgcagcgc cggctgggga gggggctgga tgcgcgcgca 240
cccgggggga ggccgctgct gcccgagca ggaggagggg gagagtgcgg cgggcggcag 300
cggcgctggc ggcgactccg ccatagagca gggggggccag ggcagcgcgc tcgccccgtc 360
cccggtgagc ggctgctgca gggaaggcgc tcggggcggc ggccgtggcc gggggcggtg 420
gaagcaggcg ggccggggcg gcggcgctctg tggccgtggc cggggccggg gccgtggccg 480
gggacgggga cggggccggg gccggggccg cggccgtccc ccgagtggcg gcagcggcct 540
tggcgcgac ggccggcgct gcggcgccg cggcgccgtccc cgcggcgcg gcggcgcgcc 600
ggagccggtc cctttcccg cggggagcgc gggggccggg cccaggggac cccggggccac 660
ggagagcggg aagaggatgg attgcccgc cctcccccc ggatggaaga aggaggaaat 720
gatccgaaaa tctgggctaa gtgctggcaa gagcgatgtc tactacttca gtccaagtgg 780
taagaagttc agaagcaagc ctgagtggc aaggtacctg ggaaatactg ttgatctcag 840
cagttttgac ttcagaactg gaaagatgat gcctagtaaa ttacagaaga acaaacagag 900
actgcgaac gatcctctca atcaaaataa gggtaaacca gacttgaata caacattgcc 960
aattagacaa acagcatcaa ttttcaaaca accggttaacc aaagtcacaa atcatcctag 1020
taataaagtg aaatcagacc cacaacgaat gaatgaacag ccacgtcagc ttttctggga 1080
gaagaggcta caaggactta gtgcatcaga tgtaacagaa caaattataa aaaccatgga 1140
actaccctaa ggtcttcaaag gagttgggtc aggtagcaat gatgagaccc ttttatctgc 1200
tggtgccagt gctttgcaca caagctctgc gccaatcaca gggcaagtct ccgctgctgt 1260
ggaaaagaac cctgctgttt ggcttaacac atctcaacc ctctgcaaag cttttattgt 1320
cacagatgaa gacatcagga aacaggaaga gcgagtacag caagtacgca agaaattgga 1380
agaagcactg atggcagaca tcttgctcgc agctgctgat acagaagaga tggatattga 1440
aatggacagt ggagatgaag cctaagaata tgatcaggta actttcgacc gactttcccc 1500
aagrgaaaat tcctagaaat tgaacaaaaa tgtttccact ggcttttgcc tgtaagaaaa 1560
aaaatgtacc cgagcacata gagcttttta atagactaa ccaatgcctt tttagatgta 1620
tttttgatgt atatatctat tattcaaaaa atcatgttta ttttgagtcc taggacttaa 1680
aattagtctt ttgtaatatc aagcaggacc ctaagatgaa gctgagcttt tgatgccagg 1740
tgcaatctac tggaaatgta gcacttacgt aaaacatttg tttccccac agttttaata 1800
agaacagatc aggaattcta aataaatttc ccagttaaag attattgtga cttcactgta 1860
tataaacata tttttatact ttattgaaag gggacacctg tacattcttc catcatcact 1920
gtaaagacaa ataaatgatt atattcacia aaaaaaaaaa aaaaaa 1966

```

<210> 2

<211> 1411

<212> ADN

<213> Homo sapiens

<220>

<223> ARN messenger antisens de la déméthylase

&lt;400&gt; 2

```

cgcattgcatg cataagcttg ctcgagtcta gatttttttt tttttttgtc tgtgaatata 60
atcattttatt tgtcttttaca gtgatgatgg aagaatgtac aggtgtcccc tttcaataaa 120
gtataaaaaat atgttttata acagtgaagt cacaataatc ttttaactggg aaattttattt 180
agaattcctg atctgttctt attaaaactg tgggggaaac aaatgtttta cgtaagtgc 240
acatttccag tagattgcac ctggcatcaa aagctcagct tcatcttagg gtcctgcttg 300
atattacaaa agactaattt taagtcctag gactcaaaat aaacatgatt ttttgaataa 360
tagatatata catcaaaaat acatctaaaa aggcattggg tagtgctatt aaaaagctct 420
atgtgctcgg gtacattttt tttcttacag gcaaaagcca gtggaacat ttttgttcaa 480
tttctaggaa ttttcycttg gggaaaagtc gtcgaaagt acctgatcat attcttaggc 540
ttcatctcca ctgtccattt caatatccat ctcttctgta tcagcagctc gcgacaagat 600
gtctgccatc agtgcttctt ccaatttctt gcgtacttgc tgtactcgtc cttcctgttt 660
cctgatgtct tcatctgtga caataaaagc ttgacagagg ggttgagatg tgtaagcca 720
aacagcaggg ttcttttcca cagcagcgga gacttgccct gtgattggcg cagagcttgt 780
gtgcaaagca ctggcaacag cagataaaag ggtctcatca ttgctacctg gaccaactcc 840
ttgaagacct ttgggtagtt ccattggttt tataatttgt tctgttacat ctgatgcact 900
aagtccttgt agcctcttct cccagaaaag ctgacgtggc tgttcattca ttcgttgttg 960
gtctgatttc actttattac taggatgatt tgtgactttg gttaccggtt gtttgaaaat 1020
tgatgctgtt tgtctaattg gcaatgttgt attcaagtct ggtttaccct tattttgatt 1080
gagaggatcg tttcgcagtc tctgtttgtt cttctgtaat ttactaggca tcatctttcc 1140
agttctgaag tcaaaaactgc tgagatcaac agtatttccc aggtaccttg ccaactgagg 1200
cttgcttctg aacttcttac cacttggaact gaagtagtag acatcgctct tgccagcact 1260
tagcccagat tttcggatca cttcctcctt cttccatccg ggggggaggg ccgggcaatc 1320
catcctcttc ccgctctccg tggcccgggg tcccctgggc ccgggccccg cgctccccga 1380
cgggaaaggg accggtccg tcgacgcggc c 1411

```

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 1...4...  
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 W / 30301

<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif)		239497 NT	
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>		0202879	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum)			
COMBINAISON CHIMIOThERAPIE ET ANTISENS DE LA DNA DEMETHYLASE.			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b>			
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) : 3, rue Michel Ange, 75016 PARIS - FRANCE			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
<b>Nom</b>		BIGEY Pascal	
<b>Prénoms</b>			
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	373, rue des Pyrénées	
	<b>Code postal et ville</b>	75020 PARIS FRANCE	
<b>Société d'appartenance (facultatif)</b>			
<b>Nom</b>		IVANOV Marie-Agnès	
<b>Prénoms</b>			
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	19, Chemin du Pré de l'Etang	
	<b>Code postal et ville</b>	94500 CHAMPIGNY SUR MARNE FRANCE	
<b>Société d'appartenance (facultatif)</b>			
<b>Nom</b>		SCHERMAN Daniel	
<b>Prénoms</b>			
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	10, rue Erard	
	<b>Code postal et ville</b>	75012 PARIS FRANCE	
<b>Société d'appartenance (facultatif)</b>			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>DU (DES) DEMANDEUR(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)		07/03/2002  92-1142	